

Importancia del soporte elástico en el control de la enfermedad:

Prevención: Especialmente en personas en condición de riesgo o antecedentes familiares. El uso permanente de media o calceta elasticada permite distribuir el flujo de sangre venosa hacia territorios profundos de las piernas reduciendo la sobrecarga en las venas superficiales retardando la aparición de várices, reduciendo el edema o hinchazón y las molestias propias de esta condición. Hoy estas medias son de regla en la prevención de la trombosis venosa en pacientes en reposo prolongado.

Terapéuticas: Una condición propia de los pacientes portadores de várices y especialmente en quienes sufren de úlcera varicosa es el aumento de la presión en las venas ubicadas bajo las rodillas. Esta presión es transmitida desde de las venas del muslo y las venas de la pelvis.

Entre los especialistas es reconocido que la terapia con compresión elástica es un pilar fundamental en el tratamiento de estas condiciones, permitiendo en el caso de pacientes portadores de várices reducir las molestias y evitar la progresión de la enfermedad hacia la úlcera varicosa y en pacientes que ya la presentan mejoran las probabilidades de curación y cierre de la lesión.



Las características de la terapia compresiva dependen en que etapa de la enfermedad se encuentre el paciente, requiriendo alta compresión (30 – 35 mmHg) aquellos pacientes portadores de úlcera venosa y de 18 a 22 mmHg en quienes, siendo portadores de várices corren riesgo de presentar ulcera varicosa.

La función principal que cumple la terapia compresiva es la reducción de la presión venosa superficial, mejorando el drenaje venoso y linfático desde los pies hacia el muslo y de éste hacia la pelvis, razón por la cual el diseño de los productos debe generar una compresión graduada, esto es, mayor presión en los pies y tobillo reduciéndose gradualmente hacia el muslo y la pelvis.




TABLA DE MEDIDAS PARA MODELOS PLUS 280 – ALTA COMPRESIÓN 500 - ANTITROMBO

TALLA	2 (S)	3(M)	4 (L)	5 (XL)
cG Circunferencia muslo cm	46 - 52	52 - 58	58 - 65	65 - 75
cD Circunferencia bajo rodilla cm	28 - 33	33 - 37	37 - 45	45 - 53
cB Circunferencia tobillo cm	18 - 21	21 - 25	25 - 29	29 - 33
IG Largura media larga cm	64 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 87
ID Largura media corta cm	34 - 38	38 - 41	41 - 43	43 - 47



Instrucciones de uso



Con la finalidad de aumentar la duración de su panty, nos permitimos aconsejarle que siempre se la coloque:

1. En posición sentada y las dos piernas a la vez, recoja y coloque la panty en la punta de ambos pies.
2. Asegurarse de que el talón esté bien calzado.
3. Estire la media hasta la rodilla, de ambas piernas, usando la palma de la mano, para colocarla en la posición óptima.
4. Levantarse y acompañar el panty hasta la cintura.